

[Origine des castes (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0915

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

25
914

(3) des adultes → une qui sur / ad perche sur
car. sex (ailes et ébauche d'ovaire). On
pourrait croire que ce sont des larves très jeunes :
une de 2 jours. Cette mue, la 1^{re} mue, permet de distinguer
l'individu et le sexe. Elle permet de se différencier
et de n'être pas. Cette mue peut donner des
individus à bles (pseudergates). Mais elle peut
produire du 10^e état. A l'issue du 10^e état
neut pas de / ni hrd : ils peuvent devenir des larves
de 1^{re} ou 2^e ou 3^e ou 4^e ou 5^e ou 6^e ou 7^e ou 8^e ou 9^e ou 10^e.
Plasie de l'individu à la 1^{re}.

Pe déterminer physico-chimique et à découvrir
(rese. indirectes).

La reg. soc. peut être une chez l'abeille.

(Rösch. 1928-1930) -

Les abeilles d'une ruche ont 1 / (un hrd par hauteur) (curieuses
et 1000, gardiennes, butineuses, nourrices). Rösch
a montré que les abeilles ont 1000 leur nourriture
certaines, butineuses etc.

Les 3 1^{ers} jours les abeilles sont occupées à la
prep. du cell. fr recevoir l'œuf.

Après : nourrices qui ne travaillent que 3 jours
à l'éclosion (miel - pollen) et 3 jours.

puis elles produisent et cette royale
elles occupent de larves (à l'éclosion ou de reine) et

4 à 9 jours).

Elle devient bruyante : ou d'abord elle fait 1^{er} vol et rentre : elle devient reeffrayée (emmagasinant miel et pollen).

Elle devient neoyeuse (au 1^{er} vol). Elle devient alors cirière : elle produit des jolis péloques au goût malsain. Pdt 3 ou 4 jours.

Elle devient alors la véritable bruyante, qu'elle reste jusqu'à la mort.

La tête du insecte est faite de souche de segments
a) segments ant du g. coudé. au gl. ant 1^{er} et 2^e les
no du cou rouch :

1^{er} paire → mandibule

2^e paire → maxillaires

3^e paire → labres.

Les yeux sont p. e. accessoires ; elles sont en action lorsqu'elles que les glandes maxillaires.

Les glandes cirières sont très simples : elles sont dans le ch. hnd (3^{es} segm. & l'abdomen).

Les gl. maxillaires fonctionnent au 3^e jour pour du miel magist ; les gl. cirières au 13^e jour pour

Les apiculteurs (ont remarqué à Roisch que les abeilles au début de l'hiver sont plus âgées : or la ruche peut procéder à la mise.