

[La société des vertébrés]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_B_f0919**

Source**Boite_044_B-48-chem | Grassé.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Il faut étudier les animaux en liberté ²⁹
918

Hierarchie très sévère : chez les loups, les chats,
les renards, les écureuils de terre, chez les chats
et les chiens (chiens esquimaux ; chiens sauvages de la
ville de Constantinople) ; les chevreuils sauvages ; les
bonis.

L'ordre social a été étudié chez les loups par
Allee : il s'agit de la hiérarchie normale = que
elle impose et espace relatif considérable : ne peut
naître en cage. La communication est élevée :
la relation entre ♀, entre ♂, entre ♂ et ♀ ; les
♂ sont + comm. les ♀.

L'ordre hiérarchique se manifeste au bout d'un
certain temps et sont stables (parfois quelques mois) ;
le dispute ne soumet pas à domination + de qu'on
remarque (en moyenne 3 semaines) - sur 4.900
observations, Allee a noté que la domination n'est
testée et est renforcée de 43% des cas.

Les mâles de Allee peuvent être critiqués : son
plan n'est pas, de + elles ne sont comparées presque
que de mâles.

A l'intérieur du groupe soc. de mamm. il y a
des manipulations + complexes

2/ des marmottes : elles se réunissent par groupes
1 terrier : 1 couloir $\frac{1}{2}$ et des chambres individuelles
et de en chambre est agrandie et les animaux
y en ~~passent~~ de l'un : c'est là qu'elles passent
l'hiver (se tenant par un ~~trou~~ ou de l'autre).
font ~~leur~~ hibernage en troupe : elles sortent des
cavités (en 4-5 jrs). Les guetteurs, les
ils ont inquiet, emettant 1 ~~type~~ ^{type} caractéristique.

3/ Castors : animaux creusifs ; ne habitent
que os des régions peu habitées ; (sur le Rhin, ils
creusent) ; au Canada (habitent) des huttes aux
parois épaisses (branches, écorces, arg. etc) ; chaque
hutte se compose ~~de~~ d'1 pièce + 1 grange (racines
et écorces) ; l'ouverture de la hutte est os l'eau ;
chacune d'elles est oeuvre collective. Les familles
ensemble, en os transportent. Les castors
poursuivent maintenir ce niveau constant : ils
peuvent creuser ou surélever du barrage.
Le barrage est 1 schéma collectif avec butoir

4/ Rat musqué : ont des mœurs analogues aux
castors (pourtant espèce différente). Ils creusent
des huttes, avec ouverture au dessus de l'eau ; struc-
ture collective ; plusieurs chambres superposées