

Psychologie différentielle

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0945

SourceBoite_044_B-50-chem | Oléron.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Historique

Terme qui vient de W. Stern : Die Diff. ψ (1911)
trad. remaniée de Ueber ψ der individuellen Differenzen

Binet et Henri en 1905 de l'intitulé ψ individuelle :
"étude des diffnd processus ψ chez l'h. l'altération du
partiel sur les diffnd individuelles de ces processus."

on dit ψ diff pr venr opposer ψ indi. à ψ sociale.

Importance de Galton de l'œuvre de Freeman inspirée
de Darwin pr qui l'élévation de l'espèce sur les diffnd indi-
viduelles.

La variation

de part

q's on considère 1 caractère mesurable possédé par
n individus, non sélectionnés, ce caractère est possédé
à n degrés différents par les n individus (théorique)

Ds 1 population, ~~car~~ la distribution est normale
le caractère est distribué selon la courbe de Gauss.

des formes

La définition ci-dessus vaut surtout pr la variation
interindividuelle.

1 Ds 1 popul. homogène la distribution de la



variation interindividuelle est unimodale.

2 hétérogénéité : c'est le fait pour 1 individu de posséder divers caractères à des degrés différents (profils)
Elle dépend de l'individu mais aussi de l'âge et de l'expérience.

3 variation dynamique ou temporelle : c'est le fait qu'un individu ne manifeste pas le même caractère au même degré à des moments différents.

Ordre de grandeur

Re les variations ^{inter}individuelles, David Wechsler "Range of human capacities" étudie le rapport entre les valeurs extrêmes obtenues sur la population (pratiques mesures du 2^e et du 999^e sur 1000)

- On + il ne faut pas faire croire que les mesures cardinales et absolues recouvrent les valeurs ordinales.

cf. fiche +	rapping	$\frac{2,23}{1}$
- tests moteurs :	temps de réaction	$\frac{2,24}{1}$
- test ψ	memorisation immédiate	$\frac{2,50}{1}$
	B.S (9 ans)	$\frac{2,30}{1}$
	code	$\frac{2,75}{1}$
	+ difficulté	$\frac{3,87}{1}$

Critiques : ① par la sensibilité au rapport cent + 99^e
centra $\frac{32}{1}$, quintile $\frac{128}{1}$; hauteur musculaire $\frac{30}{1}$
hauteur du 1^{er} ion aud. BW $\frac{136}{1}$