

[Psychologie différentielle (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0946

SourceBoite_044_B-50-chem | Oléron.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

2

(2) ce rapport portait sur la mesure non sur
l'achinite (pr sauter 2 m, il faut + que le double
de l'achinite nécessaire pr sauter 1 m) - même importance
le phéno biologique et sa manifestation

L'hétérogénéité:

Mesure : On prend la moyenne des résultats
obtenus pr des s. à certaines épreuves; pr chaque + on
établit l'écart des notes aux moyennes. La moyenne
des écarts est l'indice de dispersion qui mesure l'hétéro-
généité.

Résultat : la variation intra individuelle est
du même ordre de grandeur que la variation interindi-
viduelle.

Les résultats des individus (après) sont hétéro-
gènes que ceux des individus ports.

Les variations dynamiques.

cf. fiche sur les 3 sortes de comparation

- 2 personnes, m tests
- +ieurs tests; m personnes
- m test, m personnes; épreuves diff.



Hérédité et milieu

Me θ emp Co y en = $\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ m famille} \\ (2) \text{ m famille, d milieu} \\ \text{diff. en / ants ~ d'opti} \\ (3) \text{ dumeaux} \end{array} \right.$

Ressemblance à l'intérieur d'une famille

q / ichu $\left\{ \begin{array}{l} (2) \text{ étude des h. éminents (Galton, Termon)} \\ (3) \text{ ét. des familles (Pearson - Willoughby)} \\ (7) \text{ et de Wood sur les familles royales.} \end{array} \right.$

Ajouter: Outfit en 1933 obtient des chiffres diff. de Willoughby:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{entre la moyenne des parents et celle des enfants} \\ \text{la corr est de } 0,802 \\ \text{entre pères et mères entre } 0,723 \text{ et } 0,728 \\ \text{entre les époux de 74/} \end{array} \right.$

Galton et Wilson faisant remarquer que si l'on corrige l'âge, et que la distribution est normale obtenue (en G.B.)

$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ Parent - enfant : } 0,917 \\ 2 \text{ Père - mère : } 0,77 \\ 3 \text{ Époux : } 0,81 \end{array} \right.$

Thorndike sur des étudiants entrant à l'université (U.S.A. 1944), avec des corrections, en employant des tests intellectuels et physiques, qu'un milieu précis