

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.](#)
[Item\[Experimental behavior disorder in the rat. F.W. Finger \(in: Hunt I, pp. 413-430\) \(suite\)\]](#)

[Experimental behavior disorder in the rat. F.W. Finger (in: Hunt I, pp. 413-430) (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0961

SourceBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

a montré que la susceptibilité $\nearrow$ avec
l'itération des vepes. Maier et Glaser
ont montré qu'elle ne diminuait pas. 960

Au fait si les expels sont suffisantes
(intervalles de 24 h.), il y a réversion et
retour au seuil primitif. Si les expels sont
trop proches, il y a une phase d'adaptation et
le seuil de susceptibilité s'élève.

- Conditions alimentaires : Hu en carence
augmente la susceptibilité ; la suralimentation
(sur H humaine B.1) assure la
protection contre les crises. La déficience
de vitamine B6 peut entraîner les crises.
(probit la carence vitaminique + ~~insuffisance~~
absence de calories rendent les crises
moins faciles à obtenir)

- Conditions émotionnelles

Bien qu'elles ne soient pas le facteur déter-
minant et qu'elles puissent au contraire, au début,
elles jouent un rôle :

- Bernhard, Tolin et Signor: (Expo-
sitory studies of abnormal behavior in the
rat - J. comp. Psychol. 32, 1941) ont montré
que si le choc électrique pr force le rat à
chercher et à grimper box ne provoque

jamais de crise, du moins cette possibilité
envisage les crises audiotogéniques.

- Humphrey et Marcuse (Factors influencing
the susceptibility of rats to convulsive seizures.
1941. J. comp. Psychol. 32) ont montré que
la susceptibilité aux crises se rencontrait chez
 - 62% des rats non apprivoisés
 - 8% ——— apprivoisés

Ils ont aussi remarqué que l'activation neuro-
musculaire avert et forte par stimulation auditive
diminuait le pourcentage des crises.

- S/ Martin et Hall (1941) ont étudié
l'émotivité constitutionnelle chez le rat.