

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale. Item](#)[La névrose expérimentale et le temps \(Liddell\)](#)

La névrose expérimentale et le temps (Liddell)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0962

SourceBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(Liddell.)

1/ 1 moniteur est placé à l'arrière tranquilisé
et 1 harnais, avec 1 appareil pour relever le mouvement
de la tête et de la jambe, la respiration et
le cœur - 1 Signal télégraphique donne 1 coup
à la seconde par 10 sec, et au 11^e coup, 1
choc électrique est donné sur la patte avant.

Dans tout ce que l'animal entend le choc, il lève
la patte. Après cette attente, par suite du choc,
l'animal se débande, avant de venir à l'arrêt.
Il reste à 1 certain niveau de "watchfulness"
ou de vigilance, qui est 1 état physiolo-
gique élevé.



Pour provoquer la névrose exp^{te}, il suffit de
répéter ~~par 20 fois~~ l'exp^{te} précédente 20 fois par
jour, chacune des deux chaînes séparées par
2 minutes. L'échelle des temps doit être très rigide.

En règle, on voit apparaître 1 comportement
anormal qui se développe individuellement. 1
difficulté croissante à fléchir la jambe au
signal avant le choc: au signal, la jambe
devient rigide en extension, et elle ne bouge

no 1 mot de espule. Au lieu des motifs
rythmiques de respiration, on a 1 série de
spasmes séparés par des pauses d'appel.
Hyperbonité général (no de fonction
sphinctérien)

Bref, 1 est de "congealed vigilance or
expectancy", qui est caractéristique no 1 déséqui-
libre de l'action autonome au profit d'hyperac-
tivité parasympathique.

Un April 4 si en un mois de repos, ~~le~~ est peut
être très facile.

2/ un pattern névrotique très différent
apparaît si l'intensité entre les divers stimuli
névrotiques ne vaut + de 2 minutes, mais de
5 minutes.

- le développement du pattern n'est pas insidieux, mais
brutal; et il prend la forme non d'hyperac-
tivité parasympathique, mais d'~~activité~~ ^{hyperactivité} diffuse
d'animal manifeste du motif "tic-like" répétitif
de la jambe avant; motif de tête continues;
patterns de respiration rapide et irréguliers;
l'animal urine et défèque. Prédominance
globale de l'activité sympathique et d'hyperac-
tivité du système autonome.

[Il est possible que l'inspiration