

Névroses expérimentales

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0965

SourceBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1 Le 1^{er} fait de miroir exp^{te} a été observé
par Erofeiev.

On s'est alors chez le chien / réflexe alimentaire
par l'excitation destructive de la peau, déter-
minant 1 réflexe de défense.

A la fin de l'exp^{te} on avait obtenu que
le courant électrique ne déterminait + que
la réaction alimentaire, sans la moindre
tendance de réac. de défense. (Il y avait inhibi-
tion du centre de défense.

Or on changea le point d'application
cathode du courant électrique. Lorsqu'il g^é
néral de points fut ainsi excitée, changeant l'excitation,
m^o très légère de chaque point,
déterminant l'réac. de défense nette, et m^o
la moindre trace de réac. alimentaire.

Il fallait toujours moins de repos pour qu'on
puisse obtenir des réflexes analogues.

2 Exp^{te} de Razenkov

- On a obtenu 1 réflexe +, par 1 excitation
cathode à certain rythme ; on différencie
rythme voisin du 1^{er} sur le m^o point de

la peau -

main conque immédiate après l'excitation différenciée, on applique le rythme d'action, est ptho qui dure 5 semaines

- pdt 10 j. : disparition de l'élément conditionnel +

- pdt 14 j. : les excitations énergiques valent sans effet, les excitations faibles produisent des effets considérables

- pdt 7 j. : les excitations produisent l'action égale, comparable à celle d'une excitation énergique si l'élément est normal

- pdt 7 j. : les excitations faibles ne produisent rien, les excitations moyennes à la normale, les fortes à la normale.

Si on recommence l'action pthogène, la même succession de phénomènes se reproduit, mais est + courte. Après 1 certain nombre d'effets la perturbation ne se produit +.

R. C. (nr 358.360)