

Phénomènes paradoxaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0966

SourceBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1. Dans le cas d'inhibition pille (hypnose), on observe deux phénomènes, il y a

(a) la phase d'équilibre où les excitants provoquent la même réponse (contraire ou parallèle excitant-réponse)

(b) puis les excitants pilles donnent 1 réponse + forte que les excitations fortes (phase paradoxale)

(c) puis la phase ultra-paradoxale : l'excitant conditionné positif ne produit plus de réponse, et l'excitant négatif en produit une

2. Applications à la psychologie

- inversion de Kretschmer : 1 p. fille refonte son amour pr 1 h. ; elle a l'impression d'avoir serpenté sur le corps. Sur 1 fond d'inhibition, l'idée de virginité d'excitant se transforme en représentation inversée → sensation renouée (phase ultra-paradoxale)

- l'inhibition + 12 leur thérapeutique : on voit des schizo sortir de leur état après 20 ans de catatonie

BnF
MSS

1. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

2. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

3. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

4. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

5. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

6. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

7. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

8. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

9. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

10. To prepare a solution of the active ingredient in a suitable solvent, weigh out the required quantity of the active ingredient and dissolve it in a small quantity of the solvent. Then add the remaining solvent to make up the required volume.

R. C. (17382-360)