

Conditions pour une névrose expérimentale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0967

SourceBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La neurone est modulé par 1 absence d'équilibre entre le processus de l'excitation et de l'inhibition.

Ce déséquilibre peut se produire 4 conditions :

1/ qd 1 stimulus ^{concentré} ordinaire ^{est} pile, devient rapidement fort, - ce qui exagère la force du processus excitateur.

2/ qd on impose à l'animal 1 inhibition prolongée (en retirant, par ex, la nourriture de l'animal) - ce qui exagère la force du processus inhibiteur.

3/ en appliquant successivement des stimuli positifs et négatifs, très ~~proches~~ semblables : ce qui rend la différenciation très difficile au très monotone.

4/ l'emploi de stimuli changeants.

Parlov (1932)
in Maierman. Behavioural
neurosis. p 117.

vous auriez su que l'homme n'a pas à "briser la nécessité", mais