Decorce. Chirurgie des aliénés, thèse 1871. Ablation du clitoris [photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0454
SourceBoite_015-8-chem | [Chirurgie contre masturbation ?]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

462

Decorse. Chirurgie du cerveau, Thèse 1871

Ablation du clitoris

tation générale et la masturbation; en combattant ces causes, on guérit les névroses déterminées par ces pernicieux penchants.

Nous trouvons dans un journal allemand ce qui suit, et nous le reproduisons en ajoutant combien nous accordons peu de confiance à ce mode de traitement. D'après ce journal, l'extirpation du clitoris ne saurait être admise que pour les cas qui réuniraient les conditions suivantes : la masturbation, cause évidente et principale de l'épilepsie, de l'hystérie, de l'aliénation mentale. Tous les moyens de guérison ayant été employés et étant restés sans succès. Les avantages que l'on attend de l'opération dépassent de beaucoup les inconvénients de la mutilation exercée et de la possibilité de stérilité ultérieure ; enfin, l'opérateur croit être certain d'obtenir une guérison radicale.

Le Dr Gustave Braun, de Vienne, a fait deux opérations de clitoridectomie ; nous reproduisons les deux exemples :

1° Une femme de vingt-cinq ans, après un avortement, s'adonne à la masturbation au plus haut degré ; avec sa surexcitabilité générale du système nerveux, tout travail lui est impossible : hypertrophie du clitoris et des petites lèvres, excitation excessive de cette région au moindre contact, mouvements réflexes très-actifs, même pendant l'opération, la malade étant chloroformée.

Après divers traitements infructueux, l'amputation du clitoris est décidée et exécutée à l'aide du couteau galvano-caustique ; résultat très-favorable ; la malade est débarrassée de sa surexcitabilité nerveuse et de son exaltation générale, sans que les sensations du coït soient compromises.

2° Une jeune fille de vingt-quatre ans, par suite de masturbation, était tombée dans une décadence physique et mo-

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9622?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9622?context=pdf