# Formation d'un groupe généré par trois modules quelconques

### Auteurs : Dedekind, Richard

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Contributeur·ricesHaffner, Emmylou
ÉditeursEmmylou Haffner (Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS) ; Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

## Présentation

TitreFormation d'un groupe généré par trois modules quelconques
Date189x
Sujet

- dualité
- groupe de modules
- modules
- nombre de classes
- notation3
- rang
- trois modules

CoteCod. Ms. Dedekind X 10, p. 23
Format1 f. ; 2 p.
LangueAllemand

## Description & Analyse

DescriptionFormation d'un groupe engenrdré par 3 modules donnés quelconques a, b, c, rang d'un module engendré par application des opérations.
Tableau des modules selon leur rang.
Nombre de classes.
Mode(s) d'écriture

- Aufgaben
- Calculs phase 2
- Tableau

Auteur·es de la descriptionHaffner, Emmylou

# Relations

**Collection Cod. Ms. Dedekind X 11-1**

Ce document *utilise la même notation que :*

 Théorie des trois modules, divisibilité.

Afficher la visualisation des relations de la notice.

# Mots-clefs

dualite, groupe de modules, modules, nombre de classes, notation3, rang, trois modules

Notice créée par Emmylou Haffner Notice créée le 17/01/2019 Dernière modification le 17/09/2020

---

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Dedekind/items/show/244?context=pdf

Lösung einer Aufgabe über drei endlichen, gegebenen, nichtnullteilbaren Moduln $a, b, \tau$; Rang eines derselben ist, gefundenen Moduls ist die kleinste Zahl der Operationen $\pm$, durch die aus $a, b, \tau$ entsteht.

| Rang | Moduln |
|---|---|
| 0 | $a, b, \tau$ |
| 1 | $b_1 + \tau = a''$, $\tau + a = b''$, $a + b = \tau''$, $b - \tau = a_2$, $\tau - a = b_2$, $a - b = \tau_2$ |
| 2 | $a + a'' = b + b'' = \tau + \tau'' = \vartheta'''$, $a - a_2 = b - b_2 = \tau - \tau_2 = \vartheta_1$<br>$a - a'' = a_1$, $b - b'' = b_1$, $\tau - \tau'' = \tau_1$, $a + a_2 = a'$, $b + b_2 = b'$, $\tau + \tau_2 = \tau'$. |
| 3 | $a + b_1 = a + \tau_1 = a''$, $b + \tau_1 = b + a_1 = b''$, $\tau + a_1 = \tau + b_1 = \tau''$<br>$a - b' = a - \tau' = a_2$, $b - \tau' = b - a' = b_2$, $\tau - a' = \tau - b' = \tau_2$<br>Und eine weitere neue Zahl $b - \tau'' = a''$ 2. Ring<br>$b - \tau'' = a''$ 2. Ring |
| 4 | $a''' - a' = a_2 + a_1 = a_0$, $b''' - b' = b_2 + b_1 = b_0$, $\tau''' - \tau' = \tau_2 + \tau_1 = \tau_0$ |
| 5 | $a''' - a'' = b''' - b'' = \tau''' - \tau'' = \vartheta'$<br>$a_2 + a_0 = b_2 + b_0 = \tau_2 + \tau_0 = \vartheta_1$ |

$\vartheta''' = a + b + \tau$, $\vartheta_1 = a - b - \tau$

$a_1 = a - (b + \tau)$

$a' = a + (b - \tau)$

$a'' = (\tau + a) - (a + b)$

$a_2 = (\tau - a) + (a - b)$

$a_0 = (b + \tau) - (a + b - \tau) = (b - \tau) + (a - (b + \tau))$

$\vartheta' = (a + \tau) - (\tau + a) - (a + b)$

$\vartheta_1 = (b - \tau) + (\tau - a) + (a - b)$

$(b, \tau) = (b, a_2) = (b, \tau_2 + a_2)(\tau_2 + a_2, a_2)$
$= (b, b_2)(\tau_2, a_2)$
$= (b, b_2)(a - b, b - \tau)$
$= (b, b_2)(a - b, \tau)$
$= (b, b_2)(\tau_2, \tau)$

$(b, \tau) = (b + \tau, \tau) = (b + \tau, (b + \tau) - (\tau + a))((b + \tau) - (\tau + a), \tau)$
$= (b + \tau, \tau + a)(\tau', a)$
$= (b, \tau + a)(\tau', a)$
$= (b, b''')(\tau'', a)$

| | |
|---|---|
| $a$ | $a$ |
| $b$ | $a_2$ |
| $\tau$ | $a_1$ |
| $a_1$ | $(a_2 - a)(a - a_2) = -a_1^2 = \tau_1 \cdot \tau_2$ |
| $a_2$ | $\tau_1 + a_1 = \vartheta_1$ |
| $a''$ | $a_2 + a = (a + a_2)(a - a_2) = a_1 \cdot \vartheta_1$ |
| $a'''$ | $a_2 + a_1 = a_0$ |

$\frac{(a_2, a)(a, a_2)}{(a_2, a_2)} = (\vartheta_1, a)(a, a_2) = (a, a_2)$
$= (a, a)(a, \vartheta_1) = (a, \vartheta_1)$

also
$(a_2, a) = (a_2, a_2) = a_1$
$(a, a_2) = (a, \vartheta_1) =$

$(b, \tau) = (b, b_2)(\tau_2, \tau) = (b, b''')(\tau'', \tau)$
$(\tau, a) = (\tau, \tau_2)(a_2, a) = (\tau, \tau''')(a'', a)$
$(a, b) = (a, a_2)(b_2, b) = (a, a''')(b'', b)$

$(\tau, b) = (\tau, \tau_2)(b_2, b) = (\tau, \tau''')(b'', b)$
$(a, \tau) = (a, a_2)(\tau_2, \tau) = (a, a''')(\tau'', \tau)$
$(b, a) = (b, b_2)(a_2, a) = (b, b''')(a'', a)$

$(a, a_2) = ha$, $(a, a''') = a$
$(a_2, a) = a_1$, $(a'', a) = ha_1$

$(a, a_2) = h(a, a''')$
$(a'', a) = h(a_2, a)$
$(a, a''') = (a, a - a''') = (a, a_1)$
$(a, a_2) = (a, a_1)(a_1, a_2) = ah$
$(a_2, a) = (a_2 + a, a) = (a', a)$
$(a', a) = (a'', a')(a', a) = ha_1$

$(b, \tau)(\tau, a) = (b, b_2)(\tau_2, \tau)(\tau, \tau_2)(a_2, a)$
$(b, a) = (b, b_2)(a_2, a)$

$\frac{(b, \tau)(\tau, a)}{(b, a)} = (\tau_2, \tau)(\tau, \tau_2) = (\tau, \tau'')(\tau'', \tau)$

$\frac{(\tau, a)(a, b)}{(\tau, b)} = (a_2, a)(a, a_2) = (a, a'')(a'', a)$
$= \frac{(\vartheta, a)(a, \tau)}{(\vartheta, \tau)}$

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Dedekind/items/show/244?context=pdf

**Bremen,** Datum des Poststempels.

# Bremer Cigarren.

## Festgeschenk!

Prima Waare. — Hochelegante Ausstattung.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste gestatte ich mir folgende Marken ganz besonders zu empfehlen:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/40 | Korb | **Cuba Land** | zu Mark | **1,25** |
| 1/20 | Kiste | **ff. St. Felix** | „ „ | **3,40** |
| 1/40 | „ | **Estimar** | „ „ | **2,30** |
| 1/40 | „ | **Eisblumen** | „ „ | **2,60** |
| 1/40 | „ | **Tula** | „ „ | **4.—** |

Letztere 3 Sorten sind beste **Vuelta Havana's**

Alle 5 Theile liefere für Mark 13.—

Ausserdem erlaube ich mir auf mein **grosses, reichhaltiges Lager** in **Cigarren, Cigarretten u. Rauchtabaken** in allen Preislagen, von tadelloser Waare, wiederholt aufmerksam zu machen.

Stets beste Bedienung zusichernd, zeichne

Hochachtungsvoll

**Herm. Mentz**

Detailverkauf: **Osterthorsteinweg 77.** — Hauptlager: **Brecdenstrasse 16.**

Importirte Havana-Cigarren
von Mark **150** an per Mille

**Bremer Cigarren**, von Mark 30.— per Mille an
**Rauchtabake**, per Pfund von 70 Pfg. an
**Cigarretten**, von Mark 10.— per Mille an
**Nordhäuser Tabake, Cigarrenspitzen etc.**

**Noch von keiner Concurrenz geboten, 1 Kistchen „Por Larrango" nur Mk. 4.—**

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Dedekind/items/show/244?context=pdf