

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie, Hystérie](#)[CollectionBoite_014-1-chem | Charcot. Item](#)[Analyse d'un mutisme hystérique](#)

Analyse d'un mutisme hystérique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0038

SourceBoite_014-1-chem | Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

24. Août 88.

Analyse d'un mutisme hystérique.

357-361

J. H. de 21 ans

Charcot rappelle ce 17^e leçon du III du M. du Sy. N.

- Pas de trace d'agraphie : il rend correct^{ment} et rapidement ^{même} les questions qu'on lui pose
- Aphonie : incapable de parler / écrit, un cr. Bien l'écrit, l'orthographe presque de "Tou".
- Incapacité d'écrire mots.
- Pas de surdité verbale : on lui demande de montrer 1 œil, 1 plume, 1 rose sur la table ; 7 6 / 41
- Pas de cécité verbale : on lui montre 1 carton "communication praxique" ; il écrit en réponse "carte de médecins qui se réunissent"
- La pose de mimique expressive (vider la tête m. d'un air, la recouvrir m. d'un air) ; - l'ongue (l'aplanir)
"il perd la manipulation de gestes complexes, inintelligibles"

362 Ce cas se représente "le type du mutisme hystérique d'He 12 partie"

- L'aphasie organique ~~est~~ (ou celle du type Broca, aphasie motrice) est bien accompagnée de lésions complètes (agraphie, surdité verbale, cécité verbale)
- "L'aphasie hystérique est 1 affectus hysterique"

BnF
MSS

et modif. circulées de certaines régions, relatives
à l'activité physiologique du sang.

"Si on se rappelle la distribution des branches de l'artère
y élargie, il est très facile de comprendre que l'obstruction
d'une branche ~~provoque~~ de la violence aux branches voisines
restées, et est du côté gauche, de compromettre à
l'instant même du coup, la totalité de la
puissance du sang, sans distinction; ce n'est que
postérieurement, par suite d'un réajustement par lequel
collabent que tout ce qui restait relatif au sang
peut se réorganiser et reprendre un fonctionnement
normal.

Dans l'hypertension, la réaction est différente, les
vessies artérielles qui ont une certaine élasticité, en cas de
surpression, s'élargissent: à cause de l'élargissement
proportionnel qu'on y observe, il est très facile
de le constater.

Chez le hypertendu souffrant d'hypertension, on peut
reproduire ces effets en deux.