

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-1-chem | Skinner. \[D. Defert?\]](#)[Item](#)[Modifications dans la forme du réflexe \(suite\)](#)

[Modifications dans la forme du réflexe (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0005

SourceBoite_044_B-1-chem | Skinner. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

les courbes ont la même allure que les 5
courbes de extinction.

On veut comparer cette notion de "réserve"
à la "stimulus hunger" de Ribbe
a découvert chez des chiens, - les nourrissons
qui ont besoin moyen de sucer 2 h.p. par
un encore à la notion de Ribbe, cf
learning réprimé; Skinner lui-même définit
la notion même d'épuisement des réserves)

B Quel rapport y a-t-il entre la réserve et le renforcement.

Skinner montre que la réserve n'est pas
fonction du renforcement par 2 moyens:


1/ le reconditionnement périodique : réponse de
renforcement distribuée à des intervalles standard
de temps, aucune autre réponse n'est
renforcée. On obtient p.ex. donné les 3, 6, 9
ou 12 minutes.

On voit que cette disposition produit des
niveaux de réponses très uniformes, la valeur
est proportionnelle à la quantité de renforcement.

Par ex, Skinner trouve 15 à 20 rep. par
renforcement.

Avec le renforcement
fréquent, + est rapide
en terme de réponse,
bien que chaque série
soit peu près uniforme

On est uniforme
de réponse par renforcement
et l'extinction
ratio. Il peut servir
de mesure de learning
si différentes conditions de besoins.



Avec le renforcement périodique, la réserve est + importante qu'après le renforcement régulier. Le moyen le + efficace est d'avoir une réserve avec une série de renforcement de ce à administrer périodiquement (Skinner, p137)

2/ le renforcement à un taux fixe de réponse (at a fixed ratio). On donne une boutte de nourriture après une série standard de réponses (par ex à la 16^e, 24, 32, 48, 64, 96 et 192^e réponse.)
Rat Pht

⊕ la quantité de réponse est très élevée alors qu'avec la méthode précédente l'extinction change et la proportion de 1 à 20, elle change et la prop. de 200 à 1.