

LA VIE DES MÉTIERS

peut prendre pour temps de réaction une valeur nulle. C'est le cas lorsque l'agent est administré par voie intraveineuse ou lorsque l'agent est administré par voie orale et que la pharmacocinétique de l'agent est telle qu'il atteint rapidement la zone d'action. Cependant, lorsque l'agent est administré par voie orale et que la pharmacocinétique de l'agent est telle qu'il ne atteint pas rapidement la zone d'action, il peut être nécessaire de prendre en compte le temps de réaction. Par exemple, si l'agent est administré par voie orale et que la pharmacocinétique de l'agent est telle qu'il ne atteint pas rapidement la zone d'action, il peut être nécessaire de prendre en compte le temps de réaction. Par exemple, si l'agent est administré par voie orale et que la pharmacocinétique de l'agent est telle qu'il ne atteint pas rapidement la zone d'action, il peut être nécessaire de prendre en compte le temps de réaction.

Informations sur le fichier

Nom original : A3Bulletin50MidiPyr_Page_69.jpg

Lien vers le [fichier](#)

Extension : image/jpeg

Poids : 0.48 Mo

Dimensions : 1662 x 2350 px

Comment citer cette page

Site Comité pour l'histoire du CNRS & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-Sorbonne-Nouvelle-ENS).

Consulté le 15/01/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/ComiteHistoireCNRS/files/show/17899>

Copier

Fichier créé par [Valérie Burgos](#) Fichier créé le 09/10/2024 Dernière modification le 09/10/2024