

Boite_038-24-chem | Jackson et le néo- jacksonisme.

Auteurs : Foucault, Michel

Présentation


LangueFrançais

Les notices de la collection

14 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[Jackson et le néo-jacksonisme. \[couverture chemise\]](#)

Foucault, Michel

-c'est le passage des centres inférieurs et plus organisés aux centres supérieurs qui sont les plus bien organisés

-l'évolution est un passage du plus automatique au plus volontaire

2) Les niveaux d'inspiration

Il y en a trois:

-1^{er} on est assis les phéno réflexes élémentaires.

-2^{ème} on est assis les actes automatiques

-le niveau des actes volontaires.

On ne peut pas se ne sont des niveaux automato-physiologiques, ni des structures morphologiques.

(C) Ajouté (Cortex cérébral p125)

L'intégration selon Jackson [feuille dactylographiée]

Foucault, Michel

centres supérieurement bien organisés à la naissance vers les centres supérieurs qui s'organisent pendant toute la vie

1) "l'évolution" est un passage du plus simple au plus complexe, dans les centres les plus inférieurs vers les centres les plus supérieurs. Il n'y a pas de compensation à partir des centres inférieurs en cas de lésion des plus complexes et les plus complexes.

Supposons un centre simple, seule ont de deux centres supérieurs et de deux centres inférieurs, et les lésions au sein et les lésions supérieures sont bien séparées, de sorte que les supérieurs ne sont pas affectés par les lésions inférieures aux lésions inférieures, ce centre, quoique très simple, est hautement organisé. Il n'y a pas de compensation au sein d'un centre simple et les centres supérieurs ne compensent pas les lésions inférieures, dans lequel dépendent les fonctions dans les lésions inférieures et supérieures sont et l'apport que les centres supérieurs ne compensent pas les lésions inférieures. Voici donc un centre dans deux fois aussi complexe que le premier, mais dont nous pouvons dire qu'il est plus organisé que le premier.

2) "l'évolution" est un passage du plus automatique au plus volontaire.

Le passage de l'acte à l'acte est une évolution, car les centres les plus élevés qui représentent l'acte, l'évolution, le passage, et qui sont les plus élevés, les plus complexes, les plus

"l'évolution"

L'évolution [feuille dactylographiée]

Foucault, Michel

A. L'évolution: elle est un passage:

- du + organisé au moins organisé
- du + simple au + complexe
- du + automatique au + volontaire (= arbitraire)

B. L'œuvre complexe des fonctions

1) Les unités nerveuses ne reprennent tout ce que les organes séparés les seuls n'ont, mais ils les ont d'organes en acte complexe et la participation qu'ils ont de ces autres permet par la coopération toutes les autres unités.

- la unité est inférieure, elle est simple et ne s'organise qu'il représente (comme tout le de la machine: aff. motrice)
- la unité est de niveau élevé, et il doit représenter l'ensemble du corps, car il permet qu'il permet de la complexité de tout le corps.

(C) Ajouté (Cortex cérébral p125)

Évolution et dissociation selon Jackson (d'après Ombredane)

Foucault, Michel

- motricité active et sensibilité motrice

- qui mènent les unités supérieures et les unités inférieures.
- et celles qui ne sont pas impliquées dans les unités motrices et sensitives.

D. Dissolution

"des unités de S.N. doivent être considérées du point de vue de l'évolution, et de la dissolution de la complexité des unités d'organes, et de la dissolution des fonctions."

1. La dissolution se fait de plus en plus facile

2. La dissolution présente l'aspect positif et négatif:

- aspect négatif: suppression des manifestations d'ordre supérieur.
- aspect positif: apparition de nouvelles unités inférieures.

(C) Ajouté (Cortex cérébral p125)

[Évolution et dissociation selon Jackson - suite]

Foucault, Michel

3. Distinction des signes négatifs et positifs
caractéristiques

Il y a l'aspect organo-clinique : "il y a une lésion organique et l'aspect clinique de trouble mental" : c'est caractérisé par les réactions de la personnalité.

C'est qui peut être :

- structurel : et l'aspect clinique, il faut savoir ce qui est positif et négatif par la lésion (-), et la reformulation de la personnalité résistante (+) (cf. S. Kler)
- temporel : c'est l'aspect et processus relationnel, dans peut succéder l'organisation de la personnalité. (Eg)

Il faut distinguer :

- Dissolution uniforme
- Dissolution en vagues (Zachman)

[\(Ey et Rouart\) | P\[rin\]cipe de Jackson](#)
Foucault, Michel

Dissolution fonctionnelle : toutes les fonctions localisées qui sont l'objet propre de la neurologie et de l'aspect clinique qui sont l'objet propre de la psychiatrie.

Or, à ce point de vue, neurologie et psychiatrie ne peuvent pas être séparées et l'aspect clinique est clinique.

(106)

Ex de l'hystérie vivante par la neurologie et/ou psychiatrie ; et par la psychiatrie et/ou neurologie.

En réalité, il y a :

- 1) les troubles sensorimoteurs, les syndromes hystériques ; "crises hystériques" ; "épilepsies" sur des bases organiques ; le trouble des intégrations ; etc.
- 2) c'est-à-dire, l'aspect de dissolution uniforme, psychique, avec lésion de la personnalité hystérique (causé par la lésion).

[Ey et Rouart](#)
Foucault, Michel

Dissolution globale, mais superficielle de la personnalité.

- dépression : état de l'âme de l'individu, une réaction ; pulsions instinctuelles affectives
- névrose obsessionnelle : personnalité humaine à la fois instinctive (facteurs organiques)
- névrose hystérique : émanation d'un système idéo-affectif primitif (→ structure psychique, émanation de l'instinctuel) qui s'opère un autre de la vie de l'individu (ceci sera névrose ou réaction pour l'individu)

3. Psychoses psychotiques.

Dissolution qui (avec l'absence des réactions affectives de la personnalité) peut atteindre la régulation de la vie de l'individu (il se présente avec la personnalité affective) -

Inconscient : ne se présente cette dissolution.

[Ey et Rouart](#)
Foucault, Michel

Il y a une dissolution de l'individu, et observé par le médecin et/ou le psychiatre, et l'aspect clinique typique de ce type de dissolution.

"C'est une réaction par le niveau inférieur de l'échelle de dissolution psychique, l'absence de la vie de l'individu, et l'absence de la vie de l'individu." (178)


+ La dissolution est rapide et profonde d'un côté, + la réaction est rapide de l'autre côté, l'individu est vivant.

Originalité de la psychiatrie

"La psychiatrie a le droit de s'intéresser, en dehors des recherches physiologiques, au groupe symptomatique de la psychiatrie... La psychiatrie, dans une certaine mesure, est la science de la vie de l'individu, et la science de la vie de l'individu, et la science de la vie de l'individu." (178)

Qui est caractérisé de l'aspect organo-clinique.

[Ey et Rouart. La structure psychopathique](#)
Foucault, Michel



[Ey et Rouart. Dissolutions locales et dissolutions uniformes](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021